

CT検査をお受けになる患者様へ

依頼元:

予約日時: 令和 年 月 日 時 分

氏名: 様

受付について

- ◎ 予約時間の20分前には受付をお願いします。
- 受付後に各科外来にて検査についての説明をいたします。
- キャンセル又は予約時間に来院できない場合は早めに下記へご連絡ください。

食事について

- ◎ 造影剤を使用して検査をする場合は検査前食事(午前:朝食・午後:昼食)はできません。

【腹部の検査の方】

午前検査 : 前日の21:00(午後9時)以降は食事を控えてください。
お茶または水は飲んで構いません。

午後検査 : 当日の8:00までは食事をしてもかまいませんが、軽食でお願いします。

【腹部以外の検査の方】

食事を制限する必要はありません。

内服について

- ◎ 定期のお薬は必ず飲んでください。
ただし、朝食を摂らずに検査を受けられる方で「糖尿病のお薬を飲まれている方」「インシュリン使用中の方」は、当日の朝は内服・注射しないでください。
- ◎ 造影検査の方で、糖尿病のお薬(グリコラン・メルビン・ネルビス・メディト・メトリオン・メトグルコ・メトホルミン塩酸塩錠・ジベトス・ジベトンS腸溶錠)を飲んでおられる方は、「検査前2日間」「当日」「検査後2日間」計5日間休薬が必要となりますので主治医・看護師にご相談ください。

放射線被ばくについて

- 検査に伴う放射線被ばく(5~80mSv/回)がありますが、検査で得られる情報や治療につながる有益性が被ばくりスクを上回るように、線量を100mSv未満におさえ質の高い医療を提供するように努めます。

下記には申し出てください

- ◎ 血糖を測定する装置を身体に付けている方

検査について

- 原則として予約時間内に検査をいたします。
- ◎ 救急患者の緊急検査を行う場合には、お待たせする事もございますのでご了承ください。

造影検査後の注意

- ◎ 造影剤を注射した後は、水やお茶などの水分をいつもより多く飲んでください。
- ◎ 帰宅されてから、「蕁麻疹」「吐き気」「頭痛」「息苦しさ」等の症状が出たときは当院に連絡してください。
- ◎ 造影剤を使用された方は母乳中に移行しますので、3日間は授乳しないで下さい。

